

Construire un piège à frelons asiatiques

Classé parmi les dangers sanitaires, le frelon asiatique cause des mortalités hivernales des colonies d'abeilles. Sur les ruchers, les frelons se positionnent en vol stationnaire à l'entrée des ruches ce qui représente un stress et perturbe l'activité des butineuses. Les abeilles ne peuvent donc pas sortir librement pour récolter assez de nectar et de pollen pour passer l'hiver. La colonie s'affaiblit progressivement et meurt pendant l'hivernage.

Le piégeage des reines fondatrices au printemps n'éradique pas le frelon asiatique mais permet de limiter la pression de prédation. En effet, la capture des reines limite la formation de nouveaux nids et ainsi évite l'émergence de milliers de nouvelles reines au printemps suivant.



**Abeille
domestique**
(*Apis mellifera*)



**Bourdon
terrestre**
(*Bombus terrestris*)



**Guêpe
commune**
(*Vespa vulgaris*)




Frelon européen
(*Vespa crabro*)




Frelon asiatique
(*Vespa velutina*)

Comment fabriquer un piège à frelons asiatiques




1

Couper le goulot de la bouteille n°1.




4

Couper le culot de la bouteille n°2 et enfoncer dedans le culot de la bouteille n°1.



3

Enfoncer le goulot dans la bouteille.



6

Découper le reste de la bouteille n°2 afin de réaliser un chapeau pour le piège. Faire des trous pour laisser passer des fils qui permettront d'accrocher l'ensemble.

5

Percer la bouteille n°1 de trous de 5 mm.



(permettant aux autres insectes de quitter le piège).

2

Percer le bouchon (un trou de 8 mm pour laisser entrer les insectes) et le fond de la bouteille (des trous de 6 mm qui laisseront passer l'odeur du mélange qui attirera les frelons).



L'APPÂT

Composé d'un mélange (à quantité égale) :

- bière ou cidre
- sirop de cassis ou fruits rouges
- vin blanc

OÙ L'ACCROCHER

Là où vous constatez leur présence (et hors de portée des enfants) :

- en hauteur dans un arbre fruitier
- près d'un mur (que les frelons utilisent pour la construction des essaims)

QUAND L'UTILISER

A partir du mois de février (fin de l'hivernation) du culot

